

Исследование	Количество пациенток	Популяция пациенток	Сравнение терапии	Пациентки, получившие ХТ (%)	Медиана возраста (годы)	Медиана последующего наблюдения (годы)	БРВ	ОВ
SOFT (когорты TAM)	2045	Пациентки в пременопаузе с N0 или N+	TAM + ПФЯ TAM × 5 лет	53	43	12	76,1 % в сравнении с 71,9 % (ОР 0,82; 95 % ДИ 0,69–0,98)	89 % в сравнении с 86,8 % (ОР 0,78; 95 % ДИ 0,60–1,01)
SOFT/TEXT	4690	Пациентки в пременопаузе с N0 или N+	Эксеместан + ПФЯ × 5 лет TAM + ПФЯ × 5 лет	60	43	13	80,5 % в сравнении с 75,9 % (ОР 0,79; 95 % ДИ 0,70–0,90)	90,1 % в сравнении с 89,1 % (ОР 0,93; 95 % ДИ 0,78–1,11)
ABCSG-12	1803	Пациентки в пременопаузе с поражением < 10 лимфатических узлов	Анастрозол + ЛГРГ TAM + ЛГРГ оба + ЗОЛ × 3 года	5,7	45	8,0	ОР 0,77; 95 % ДИ 0,60–0,99; <i>p</i> = 0,042	ОР 0,66; 95 % ДИ 0,43–1,02; <i>p</i> = 0,064
HOBOE (когорты без ЗОЛ)	710	Пациентки в пременопаузе с N0 или N+	Летрозол + ЛГРГ TAM + ЛГРГ	63	44	5,3	93,2 % в сравнении с 85,4 % (ОР 0,72; 95 % ДИ 0,48–1,07)	Н/П
ASTRRA	1293	Пациентки в пременопаузе, у которых восстановилась функция яичников после ХТ	TAM × 5 лет + ПФЯ TAM × 5 лет	100	40	8,9	85,4 % в сравнении с 80,2 % (ОР 0,67; 95 % ДИ 0,51–0,87)	96,5 % в сравнении с 95,3 % (ОР 0,78; 95 % ДИ 0,49–1,25)
E-3193 (INT-0142)	345	Пациентки в пременопаузе с N0 < 3 см, не получавшие ХТ	Монотерапия TAM TAM + ПФЯ	0	45	9,9	87,9 % в сравнении с 89,7 % (ОР 1,17; 95 % ДИ 0,64–2,12)	95,2 % в сравнении с 97,6 % (ОР 1,19; 95 % ДИ 0,52–2,70)